

# Neporex 50 SP

EFFEKTIVT

Er en nyudviklet formulering til bekæmpelse af flueformeringen allerede på larvestadiet..



**Neporex 50 SP** er en 50 % koncentreret letopløseligt pulver, nøjagtig lige så effektiv som Neporex WG 2, men nemmere og hurtigere i brug.

*Midlet har ingen effekt på voksne fluer.*

**Neporex 50 SP** virker ved at hæmme fluelarvernes skeletdannelse, så de dør under væksten. Er effektivt overfor alle typer resistente danske fluer og har vist, at midlet er lige effektivt overfor dem alle. Neporex 50 SP er derfor særligt egnet, hvor andre midler og metoder svigter. Da midlet kun virker i larvestadiet, bruges midlet bedst forebyggende inden der er for mange fluer. Voksne fluer, tilflyvende fluer samt fluer under udvikling bekæmpes bedst med **Agita**, **Spy**, **Aquapy** eller **Turbo-Jet**

#### **Kalve- og kvægstalde på dybstrøelse**

Fluernes ynglesteder findes i ca. 50 cm bredde zoner langs væggene, ved eller i nærheden af konstruktioner, hvor dybstrøelse ikke trampes sammen af dyrene. Kun disse randzoner skal behandles. Det er vigtigt, at behandle 1 – 3 dage efter udrensning, da der skal behandles på gødning. Udrenses boksene ikke, er en 2. behandling nødvendig efter 14 dage og ved stor tilflyvning evt. flere behandlinger.

#### **Fjerkræ på net eller i bure**

I fjerkræhold, hvor dyrene holdes på net eller i bur, kan udbringning foretages enten ved udstrøning eller udsprøjtning. Ved fugtig gødning er udrensning at foretrække. Er gødningslaget mere end 10 cm dybt, gennemføres behandlingen med dobbelt dosering, dvs. 20 gram pr. 10 m<sup>2</sup>, 2. behandling udføres efter 14 dage med normal dosering.

#### **Svinestald med og uden spaltegulv**

Hele gulvfladen i strøelses- og gødningszonen skal behandles, ligeledes det samlede spaltegulv. Det er vigtigt at behandle helt ud langs kanter og hjørner. Ved »alt ind – alt ud« systemet kan behandling ske 3 – 5 dage efter opstaldning.

#### **Minkfarme (Den lille stueflue)**

Larvebekæmpelse startes umiddelbart efter, at hovedparten af forårsgenerationer er udklækket, ca. 4 uger efter, at de første fluer har vist sig, dvs. medio juni.

**Det præcise behandlingstidspunkt bestemmes nemt ved, at der ses mange voksne fluer på minkfarme.**

Efter udmugning udvandes 2 gram pr. m<sup>2</sup> i ca. 1 meters bredde under burene (i hele sandlagets bredde). 14 dage senere behandles selve gødningsrækken (ca. 30 cm bredde) med 50 gram pr. m<sup>2</sup>. Med denne strategi undgår man, at efterårsgenerationen af den lille stueflue kommer på vingerne og yderligere behandling dette år skulle være unødvendig.

Udskiftes hele sandlaget ikke i perioden fra november til april, kan man med fordel foretage larvebekæmpelse om efteråret ca. 4 uger efter, at efterårsgenerationen er begyndt at gå på vingerne dvs. medio september. Der behandles 2 gange med 14 dages mellemrum som angivet ovenfor. Med denne strategi undgår man, at den efterfølgende forårsgeneration kommer på vingerne.

Der er altså to alternativer for bekæmpelse af den lille stueflue med Neporex. Hvis fluetrykket er meget højt, eller hvis æglægningen på det tidspunkt, hvor man har valgt at sætte ind, er blevet spredt ud over en længere periode pga. vejrforholdene, kan det være nødvendigt at foretage behandlingen både forår og efterår.

**Neporex 50 SP** er anerkendt af Statens Skadedyrlaboratorium til bekæmpelse af fluelarver.

**Langtidsvirkende - ca. 4 uger.**

#### **Deklaration:**

Cyromazin 50 %.

#### **Dosering:**

1 g pr. m<sup>2</sup> vandtes eller sprøjtes ud.

Blanding med andre insektmidler er ikke aktuelt.

#### **Emballage:**

250 g dåse.



**trinol**