

## Forebyggende og langtidsvirkende bekæmpelse..



*Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af flue- og myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs gødningsanlæg.*

### Fluer

Dimilin anvendes til fluebekæmpelse i alle staldtyper samt på møddinger og andre steder, hvor fluer opformerer. Der er kun virkning på fluelarver, og det er derfor nødvendigt at behandle alle steder, hvor fluelarver findes.

Præparatet virker ikke øjeblikkeligt dræbende, men hindrer larverne i at blive til fluer. Dimilin har virkning i 3 - 4 uger, hvorefter der skal behandles igen.

Dimilin bekæmper også fluer, som er resistente overfor andre fluemidler.

### Kvæg og heste

I bokse med dybstrøelse behandles strøelsen 3 - 7 dage efter rensning. Det er vigtigt at behandle alt strøelse helt ud til yderkanter af bokse. Efter 3 - 4 uger behandles igen. I dybstrøelsesstalde med tunge dyr, som store kreaturer eller heste, er det muligt at begrænse behandlingen til de områder, der ikke betrædes af dyrene. Der behandles i ca. 1 meters bredde langs kanter og andre steder, hvor gødning ikke betrædes.

I båsstalde skal der på steder, hvor der samles gødningsrester eller foderrester (særlig bag krybbekanter), behandles med 3 ugers interval.

I riste- og spaltestalde vil der på kanten af gødningskanalen være fluelarver, og disse kanter skal derfor behandles hver 3. - 4. uge.

### Svin

I svinestalde med fast gulv behandles hele gulvfladen i såvel området med strøelse som i rensegangen hver 3. - 4. uge. Det er vigtigt at behandle omhyggeligt langs kanter af stierne.

### Fjerkræ

I fjerkræhuse bekæmpes fluerne ved at behandle ansamlinger af gødning hver 3. - 4. uge.

### Minkfarme

I minkfarme (den lille stueflue) behandles den del

af sandlaget under burene, hvor der kan forekomme foderrester og gødning. Der behandles med 3 - 4 ugers mellemrum startende medio maj, når fluernes formering starter. Behandlinger i maj/ juni forebygger årets kraftige, første opformering, og der følges op hen over sommeren. Behandling i efteråret (september) forebygger næste års flueproblemer.

Der er effekt på fluelarver generelt, inklusiv den lille stueflue.

Anvend 4 g Dimilin i 1 liter vand pr. m<sup>2</sup>.

### Møddinger

På møddinger behandles nyudkørt gødning.

### Champignonkulturer

I champignonkulturer bekæmpes larver af champignonmyg med 4 g Dimilin pr. m<sup>2</sup> champignonbed. Der foretages udvanding af produktet i 1/4 l vand pr. m<sup>2</sup>, lige efter der er lagt dækjod på de nyplantede bede.

### Deklaration:

Diflubenzuron 25%.

### Dosering:

4 g pr. m<sup>2</sup>. Gælder også minkfarme (Lille stueflue).

### Emballage:

40 g rækker til 10 m<sup>2</sup>.

